

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE NELLA PRATICA CLINICA DELLE PARADENTITI APICALI ACUTE NELL'ADULTO (PAA).

La “Canadian Collaboration on Clinical Practice Guidelines in Dentistry” (CCCD) ha definito le **linee guida per la gestione nella pratica clinica delle parodontiti apicali acute dell'adulto** (approvate dal consiglio della CCCD il 6 Dicembre 2001). Tale lavoro ha lo scopo di aiutare l'odontoiatra e il paziente nella scelta terapeutica più appropriata nelle diverse situazioni cliniche.

La versione completa e continuamente aggiornata delle linee guida e i metodi utilizzati per lo sviluppo delle stesse sono disponibili online sul sito www.cccd.ca.

OBBIETTIVO Le linee guida sono state formulate per aiutare il clinico ad alleviare il dolore nel paziente affetto da parodontite apicale acuta (PAA).

DEFINIZIONE La PAA è una infezione periapicale causata dalla necrosi pulpare non trattata.

SINTOMI DELL'PAA

- β Dolore acuto al contatto occlusale o alla percussione
- β Dolore costante e insorto in breve tempo
- β Sporadici segni di sensibilità al cambiamento di temperatura
- β Risposta ai test di vitalità pulpare negativa o ritardata
- β Assenza di cambiamenti radiografici
- β Possibile aumento dello spazio parodontale

ESCLUSIONI Si raccomanda di non applicare le linee guida per la PAA in pazienti con gonfiore, radiotrasparenza periapicale in assenza di sintomi sistemici

CONSIGLI

- β Eseguire terapia endodontica prima possibile
- β Il paziente dovrebbe assumere, prima della terapia o immediatamente dopo, farmaci antiinfiammatori (FANS salvo specifiche controindicazioni)

- β Nel caso in cui non possa essere eseguita terapia endodontica in breve tempo il paziente dovrebbe essere sottoposto ad una appropriata terapia analgesica
- β In alcuni casi l'estrazione può essere considerata una alternativa alla terapia endodontica
- β Rimuovere gli eventuali precontatti occlusali sul dente
- β Non c'è indicazione per la terapia antibiotica , né per eseguire la fistolizzazione chirurgica.

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE NELLA PRATICA CLINICA DEGLI ASCESSI APICALI ACUTI NELL'ADULTO (AAA).

La “Canadian Collaboration on Clinical Practice Guidelines in Dentistry” (CCCD) ha definito le **linee guida per la gestione nella pratica clinica degli ascessi apicali acuti dell'adulto** (approvate dal consiglio della CCCD il 6 Dicembre 2001). Tale lavoro ha lo scopo di aiutare l'odontoiatra e il paziente nella scelta terapeutica più appropriata nelle diverse situazioni cliniche.

La versione completa e continuamente aggiornata delle linee guida e i metodi utilizzati per lo sviluppo delle stesse sono disponibili online sul sito www.cccd.ca.

OBBIETTIVO Le linee guida sono state formulate per aiutare il clinico ad alleviare il dolore nel paziente affetto da ascessi apicali acuti (AAA).

DEFINIZIONE L'AAA è una infezione periapicale causata dalla necrosi pulpare non trattata.

SINTOMI DEGLI ASCESSI ACUTI

- β Dente non vitale
- β Dolore
 - A rapida insorgenza
 - Intensità da lieve a pulsante
 - Provocato dalla percussione o dal contatto occlusale
- β Gonfiore
 - Palpabile, fluttuante
 - Localizzato o esteso
- β Segni radiologici
 - Nessun aumento della radiotrasparenza periapicale

CONSIGLI

- Un ascesso localizzato o diffuso dovrebbe essere drenato appena possibile mediante terapia endodontica, non chirurgica, incisione chirurgica, estrazione. La scelta dei diversi trattamenti è condizionata dal giudizio clinico o dalle esigenze del paziente.
- E' consigliata la somministrazione di un'adeguata terapia analgesica fino a quando l'ascesso non può essere drenato adeguatamente.
- In caso di infezione localizzata la terapia antibiotica per via sistemica non migliora il beneficio ottenuto mediante drenaggio.
- La terapia antibiotica trova indicazione nei pazienti con complicanze cliniche sistemiche (febbre, linfadenopatie, cellulite), gonfiore esteso o pazienti con indicazioni mediche.
- Nella gestione delle complicanze dell'AAA trovano indicazione antibiotici a largo spettro.
- Il paziente dovrebbe assumere, prima del drenaggio e/o immediatamente dopo farmaci analgesici (FANS salvo specifiche controindicazioni) e continuare la terapia al bisogno in caso di dolore
- La terapia antibiotica non trova indicazione nei pazienti asintomatici e in caso di ascesso localizzato.